

SIFILIS este o infectie veche de cand lumea si totusi atat de actuala, parca mereu mai actuala, si atunci te poti intreba "Cum se face ca sifilisul inca mai este un pericol ?" ... raspunsul cel mai sigur : ignoranta si indiferenta. Uneori sifilisului i se spune si "cruci in sange" din cauza rezultatului pozitiv (+ + +) al testului de sange. O alta denumire a sifilisului este "lues".

TRANSMITERE

Cea mai frecventa cale de transmitere directa a sifilisului o reprezinta calea sexuala, prin contactul cu fluide biologice infectate sau prin contact direct cu ulceratiile provocate de infectie, mai ales in stadiile primar si secundar ale infectiei.

MANIFESTĂRI

Principala manifestare a sifilisului este aparitia sancrului - o leziune a pielii, de forma regulata, rotunda sau ovala, dura, nedureroasa - si marirea in volum si inflamarea ganglionilor limfatici (adenopatie) in perioada de "sifilis secundar" apar alte manifestari caracteristice - leziuni cutanate si ale mucoaselor Chiar si in lipsa unui tratament toate aceste simptome vor disparea de la sine dar odata cu ele NU va disparea si infectia.

TRATAMENT

Tratamentul este foarte sigur dar cu conditia sa fie facut cat mai repede dupa infectare. Medicul va prescrie mai multe doze de antibiotice in reprize. Dupa terminarea tratamentului este obligatorie o noua testare pentru a fi sigur de eficacitatea acestuia.

HPV este prescurtarea de la Human Papiloma Virus și este un virus extrem de contagios, infecția cu acesta fiind frecvent întâlnită.

Virusul se poate transmite pe cale sexuală, fără ca partenerii să aibă habar de existența acestuia, prin orice tip de contact genital direct cu o persoană deja infectată. Virusul se transmite și în alt mod decât pe cale sexuală, ca de exemplu prin mâini infectate, lenjerie, prosoape, transmitere de la mamă la făt în momentul nașterii, purtarea hainelor persoanelor infectate

SanLife - 5 ani de activitate
Le mulțumim ca ne-au fost alături:



Răspândește informația, nu virusul!



Informează-te!
Este dreptul, dar și
responsabilitatea ta!

Călin Hopșitar
Psiholog
Tel: 0740 011 894

www.sanlife.ro
f / SanLife

Fii informat pentru a putea separa adevărul de ficțiune!

Dacă știi ce sunt HIV și SIDA, poți anula orice neadevăr pe care îl vei auzi.

 **HIV** (virusul imunodeficienței umane)- atacă și distruge sistemul imunitar al organismului deschizând calea unor infecții oportuniste, pe care un sistem imunitar sănătos ar putea să le țină sub control.

În cazul infecției cu HIV sistemul imunitar este compromis, iar aceste infecții oportuniste au un impact devastator asupra organismului.

HIV SE TRANSMITE

Prezența într-o colectivitate a unei persoane seropozitive **NU** constituie un pericol pentru persoanele sănătoase atâta timp cât nu există condiții de transmitere a infecției.

 **SIDA** (sindromul imunodeficienței umane dobândite) În momentul declanșării, fiecare afecțiune are anumite semne și simptome ce o caracterizează. Totalitatea semnelor și a simptomelor poartă numele de sindrom.

SIDA este un stadiu în care apar semne și simptome ale diferitelor infecții oportuniste care încep să distrugă organismul lipsit de apărare pe fondul infecției cu HIV. Așadar, SIDA este un sindrom, un stadiu.

SIDA NU SE TRANSMITE

Oricine se poate infecta cu HIV dacă nu se protejează, indiferent de rasă, religie, vârstă, orientare sexuală sau statut social.

Virusul HIV se transmite prin:

- contact sexual neprotejat;
- transfuzii de sânge;
- contact cu sângele infectat (rana pe rană);
- de la mama infectată la făt, în timpul sarcinii și al alăptării.

CUM SE MANIFESTĂ INFECȚIA

Perioada de incubație poate dura de la câteva luni până la câțiva ani. Pot să nu apară semne de boală, dar persoana respectivă să transmită virusul.

Când apar simptomele, ele pot fi ușor confundate cu ale altor afecțiuni, cum ar fi:

- transpirații persistente;
- oboseală;
- febră persistentă, uneori cu transpirații nocturne;
- slăbirea rapidă, fără cauză aparentă;
- diaree persistentă;
- mărirea ganglionilor limfatici.

Aceste simptome pot apărea și în cazul altor afecțiuni. Dacă le avem nu înseamnă neapărat că avem HIV.

PREVENIRE - PROTEJARE

- Folosește prezervativul pentru fiecare contact sexual;
- Ai grijă cum folosești prezervativul;
- Limitează-ți numărul de parteneri sexuali, încearcă să afli cât mai multe despre trecutul partenerului;
- Atenție la folosirea obiectelor tăioase sau înțepătoare în comun cu persoane pe care nu le cunoști;
- Folosește numai seringi de unică folosință și DOAR o singură dată.

Virusul HIV nu se transmite prin:

- aer;
- atingere, sărutul social;
- îmbrățișare;
- apă, băi sau wc-uri publice;
- ștranduri;
- înțepături de țânțari sau alte insecte;
- folosirea în comun a rechizitelor.

Testul HIV

Este un test indirect, care indică prezența în organism a anticorpilor împotriva HIV, nu a virusului propriu-zis.

Se recomandă testarea mai ales în situațiile în care:

- ai avut contacte sexuale neprotejate cu persoane despre care nu știi foarte multe;
- ai avut parteneri sexuali multipli;
- ai suferit o intervenție chirurgicală sau o transfuzie în condiții nesterile;
- dorești să ai un copil;
- dorești să te căsătorești sau să ai o relație stabilă.

 **HEPATITA B** reprezintă infecția ficatului cu virusul hepatic B (VHB).

Virusul hepatic B se transmite prin contactul cu sângele sau alte fluide ale corpului unei persoane infectate. De asemenea, se transmite prin înțeparea/ tăierea cu instrumentar nesterilizat, care poate conține sânge infectat.

Hepatita B **NU** se transmite prin alimente, apă sau simplul contact fizic.

Hepatita B acută se poate manifesta prin semne și simptome, ușoare sau severe, care apar la aproximativ 12 săptămâni de la infectare. În majoritatea cazurilor nu apare niciun simptom; atunci când apar, se manifestă astfel:

- dureri de cap frecvente;
- dureri articulare și musculare;
- febră;
- disconfort persistent în partea dreaptă a abdomenului;
- lipsa poftei de mâncare, greață;
- icter (îngălbenirea pielii și a ochilor).

Dacă ai fost expus la această infecție prin contact cu sânge infectat sau contact sexual neprotejat, TREBUIE să te testezi!

PREVENIRE

Vaccinul hepatic B este cel mai eficace mod de a preveni infectarea. Vaccinul are o eficacitate de 95% împotriva hepatitei B doar dacă sunt administrate toate dozele necesare (3 sau 4 administrări, după caz). Vaccinul oferă protecție împotriva infectării cu virusul hepatic B cel puțin 20 de ani. Deși vaccinul nu este folosit pe scară largă printre adulți, cei din categoriile cu risc crescut de infectare trebuie să se vaccineze împotriva acestui virus.